

































نمره آزمون	آزمون فصل ۵ ریاضی پایه متوسطه دوم (هشتم) بردار و مختصات	نام و نام خانوادگی
آزمون کار	مدت: ۹۰ دقیقه نام دبیر: تعداد سؤال: ۲۰	آزمون شماره ۶
نمره	سؤال	ردیف
۱	<p>۱. مشخص کنید کدام بردار حاصل جمع بردارهای دیگر است. سپس برای هر یک شکل یک جمع برداری و یک جمع مختصاتی بنویسید.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: flex-start;"> <div style="text-align: center;">  <p>..... + =</p> <p>[] + [] = []</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>..... + + = []</p> <p>[] + [] + [] = []</p> </div> </div>	
۱	<p>۲. یک بردار به نام b مساوی با بردار $(\vec{a})$ رسم کنید و مختصات هر دو بردار را بنویسید.</p> <div style="display: flex; align-items: center;">  <div style="margin-left: 20px;"> $\vec{a} = [\quad]$ $\vec{b} = [\quad]$ </div> </div>	
۱/۵	<p>۳. حاصل جمع بردارهای هر شکل را رسم کنید.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;">  </div>	
۱/۵	<p>۴. مختصات دو برداری را بنویسید که حاصل جمعشان بردار $\begin{bmatrix} ۲ \\ -۴ \end{bmatrix}$ باشد. این سؤال چند جواب دارد؟</p> <p>$[\quad] + [\quad] = \begin{bmatrix} ۲ \\ -۴ \end{bmatrix}$</p>	
۱	<p>۵. الف) در چه حالت جمع دو بردار صفر می‌شود؟ ب) سه بردار $\vec{a}$، $\vec{b}$ و $\vec{c}$ را طوری رسم کنید که حاصل جمع آنها برابر صفر شود.</p>	


نمره آزمون	آزمون فصل ۵ ریاضی پایه متوسطه دوم (هشتم) بردار و مختصات	نام و نام خانوادگی
آزمون کار	نام دبیر: مدت: ۹۰ دقیقه تعداد سؤال: ۲۰	آزمون شماره ۶
نمره	سؤال	ردیف
۱	<p>۱. مشخص کنید کدام بردار حاصل جمع بردارهای دیگر است. سپس برای هر یک شکل یک جمع برداری و یک جمع مختصاتی بنویسید.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: flex-start;"> <div style="text-align: center;">  $\vec{a} + \vec{c} = \vec{a}$ $\begin{bmatrix} 0 \\ 4 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} -4 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -4 \\ 0 \end{bmatrix}$ </div> <div style="text-align: center;">  $\vec{a} + \vec{d} + \vec{c} = \vec{b}$ $\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \end{bmatrix}$ </div> </div>	
۱	<p>۲. یک بردار به نام b مساوی با بردار $(\vec{a})$ رسم کنید و مختصات هر دو بردار را بنویسید.</p> <div style="display: flex; align-items: center;">  <div style="margin-left: 20px;"> $\vec{a} = \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \end{bmatrix}$ $\vec{b} = \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \end{bmatrix}$ </div> </div>	
۱/۵	<p>۳. حاصل جمع بردارهای هر شکل را رسم کنید.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: flex-start;"> <div style="text-align: center;">  </div> <div style="text-align: center;">  </div> <div style="text-align: center;">  </div> </div> <p style="text-align: center; margin-top: 10px;">در شکل بالای می توان مشاهده کرد که می توان بدون رسم بردارهای (غیر ضروری) جمع بردار حاصل بردارهای را رسم کرد چون بردارها به دنبال هم هستند</p>	
۱/۵	<p>۴. مختصات دو برداری را بنویسید که حاصل جمعشان بردار $\begin{bmatrix} 2 \\ -4 \end{bmatrix}$ باشد. این سؤال چند جواب دارد؟ بی نهایت</p> $\begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 \\ -3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ -4 \end{bmatrix}$	
۱	<p>۵. الف) در چه حالت جمع دو بردار صفر می شود؟ اگر در بردار قرینه باشند</p> <p>ب) سه بردار $\vec{a}$، $\vec{b}$ و $\vec{c}$ را طوری رسم کنید که حاصل جمع آنها برابر صفر شود.</p> <div style="display: flex; align-items: center;">  <div style="margin-left: 20px;"> $\vec{a} + \vec{b} + \vec{c} = \vec{0}$ </div> </div>	



ردیف	سؤال	نمره
۶.	<p>برای هر شکل یک جمع برداری و یک جمع مختصاتی بنویسید.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: flex-start;"> <div style="text-align: center;">  <p>..... + =</p> <p>[] + [] = []</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>..... + = +</p> <p>[] + [] = [] + []</p> </div> </div>	۱
۷.	<p>با توجه به بردارهای داده شده بردارهای y و b را از نقطه مورد نظر رسم کنید. $\vec{y} = -2\vec{x}$ $\vec{b} = 2\vec{a}$</p> 	۱
۸.	<p>رابطه دو بردار a و b را با یک تساوی برداری و یک تساوی مختصاتی نشان دهید.</p>  <p>$\vec{a} = \dots\dots\dots$ $[\quad] = \dots\dots\dots$</p>	۱
۹.	<p>بردار $\vec{x}$ و $\vec{y}$ مفروض‌اند. بردار $\vec{z} = \vec{x} + 3\vec{y}$ را رسم کنید.</p> 	۷۵٪
۱۰.	<p>در هر شکل بردار c را بر حسب بردارهای $\vec{a}$ و $\vec{b}$ بنویسید.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: flex-start;"> <div style="text-align: center;">  <p>$\vec{c} = \dots\dots\dots + \dots\dots\dots$</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>$\vec{c} = \dots\dots\dots + \dots\dots\dots$</p> </div> </div>	۱

ردیف	سؤال	نمره
۶.	<p>برای هر شکل یک جمع برداری و یک جمع مختصاتی بنویسید.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: flex-start;"> <div style="text-align: center;">  $\vec{AB} + \vec{BC} = \vec{AC}$ $\begin{bmatrix} -1 \\ 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 2 \end{bmatrix}$ </div> <div style="text-align: center;">  $\vec{BC} + \vec{CD} = \vec{BD}$ $\begin{bmatrix} 0 \\ 2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix}$ </div> </div>	۱
۷.	<p>با توجه به بردارهای داده شده بردارهای y و b را از نقطه مورد نظر رسم کنید. $\vec{y} = -2\vec{x}$ $\vec{b} = 2\vec{a}$</p> 	۱
۸.	<p>رابطه دو بردار a و b را با یک تساوی برداری و یک تساوی مختصاتی نشان دهید.</p>  $\vec{a} = -2\vec{b}$ $\begin{bmatrix} 2 \\ 2 \end{bmatrix} = -2 \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \end{bmatrix}$	۱
۹.	<p>بردار $\vec{x}$ و $\vec{y}$ مفروضه‌اند. بردار $\vec{z} = \vec{x} + 3\vec{y}$ را رسم کنید.</p> 	۱/۷۵
۱۰.	<p>در هر شکل بردار c را بر حسب بردارهای $\vec{a}$ و $\vec{b}$ بنویسید.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: flex-start;"> <div style="text-align: center;">  $\vec{c} = -1\vec{a} + (-1)\vec{b}$ </div> <div style="text-align: center;">  $\vec{c} = 1\vec{a} + 1\vec{b}$ </div> </div>	۱

ردیف	سؤال	نمره
۱۱.	با توجه به بردارهای a و b بردار c را رسم کنید. $\vec{c} = -3\vec{a} + 3\vec{b}$ 	۱
۱۲.	با توجه به بردارهای a و b و c بردار d را رسم کنید. $\vec{d} = \vec{a} + 2\vec{b} - \vec{c}$ 	۱
۱۳.	حاصل عبارت‌های زیر را به دست آورید. $(-2) \begin{bmatrix} 1 \\ -5 \end{bmatrix} - (-\frac{1}{2}) \begin{bmatrix} 4 \\ 0 \end{bmatrix} =$	۱
۱۴.	با توجه به بردارهای a و b ، مختصات بردار c را به دست آورید. $\vec{a} = \begin{bmatrix} 1 \\ -2 \end{bmatrix}, \vec{b} = \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \end{bmatrix}, \vec{c} = -3\vec{a} + 2\vec{b} =$	۱
۱۵.	بردارهای داده شده را روی امتدادهای رسم شده تجزیه کنید. 	۱
۱۶.	بردارهای داده شده را بر حسب $\vec{i}$ و $\vec{j}$ و سپس به صورت مختصاتی بنویسید. $\vec{a} =$ $\vec{b} =$ 	۱

ردیف	سؤال	نمره
۱۱	با توجه به بردارهای a و b بردار c را رسم کنید. $\vec{c} = -3\vec{a} + 2\vec{b}$ 	۱
۱۲	با توجه به بردارهای a و b و c بردار d را رسم کنید. $\vec{d} = \vec{a} + 2\vec{b} - \vec{c}$ 	۱
۱۳	حاصل عبارتهای زیر را به دست آورید. $(-2) \begin{bmatrix} 1 \\ -5 \end{bmatrix} - (-\frac{1}{2}) \begin{bmatrix} 4 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -2 \\ 10 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 10 \end{bmatrix}$	۱
۱۴	با توجه به بردارهای a و b مختصات بردار c را به دست آورید. $\vec{a} = \begin{bmatrix} 1 \\ -2 \end{bmatrix}, \vec{b} = \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \end{bmatrix}, \vec{c} = -3\vec{a} + 2\vec{b} = -3 \begin{bmatrix} 1 \\ -2 \end{bmatrix} + 2 \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -3 \\ 6 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 6 \\ 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 \\ 8 \end{bmatrix}$	۱
۱۵	بردارهای داده شده را روی امتدادهای رسم شده تجزیه کنید. 	۱
۱۶	بردارهای داده شده را بر حسب $\vec{i}$ و $\vec{j}$ و سپس به صورت مختصاتی بنویسید. $\vec{a} = 4\vec{i} + 2\vec{j} = \begin{bmatrix} 4 \\ 2 \end{bmatrix}$ $\vec{b} = -2\vec{i} - 3\vec{j} = \begin{bmatrix} -2 \\ -3 \end{bmatrix}$ 	۱

ردیف	سؤال	نمره
۱۷.	الف) معادله مختصاتی زیر را حل کنید. $3\vec{i} + 2\vec{j} + 3\vec{x} = \begin{bmatrix} 0 \\ -4 \end{bmatrix}$ <p>ب) اگر $\vec{\alpha} = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix}$ و $\vec{b} = 2\vec{i} + \vec{j}$ باشد مختصات بردار $\vec{x}$ را پیدا کنید.</p> $\vec{i} + \vec{x} + 2\vec{\alpha} + 2\vec{b} = 0$	۱/۵
۱۸.	اگر $\vec{\alpha} = 3\vec{i} + 2\vec{j}$ و $\vec{b} = \vec{i} - 2\vec{j}$ باشد مختصات بردار $\vec{x}$ را به دست آورید.	۱
۱۹.	برداری را روی دستگاه مختصات رسم کنید و آن را بر حسب بردارهای واحد $\vec{i}$ و $\vec{j}$ بنویسید.	۱
	 $\vec{\alpha} = \begin{bmatrix} 3 \\ -2 \end{bmatrix}$	
۲۰.	الف) اگر $\vec{m} = 5\vec{j}$ باشد مختصات بردار $\vec{m}$ کدام گزینه است؟ $\textcircled{۱} \begin{bmatrix} ۱ \\ ۵ \end{bmatrix}$ $\textcircled{۲} \begin{bmatrix} ۵ \\ ۱ \end{bmatrix}$ $\textcircled{۳} \begin{bmatrix} ۰ \\ ۵ \end{bmatrix}$ $\textcircled{۴} \begin{bmatrix} ۵ \\ ۰ \end{bmatrix}$ در هر یک از حالت‌های زیر بردار حاصل جمع را رسم کنید. ب) حالتی را رسم کنید که بردار حاصل جمع سه بردار، از هر یک از سه بردار بزرگتر است. ج) حالتی را رسم کنید که بردار حاصل جمع سه بردار از هر یک از سه بردار کوچکتر است.	۷۵/.

ردیف	سؤال	نمره
۱۷	الف) معادله مختصاتی زیر را حل کنید. $3\vec{i} + 2\vec{j} + 3\vec{x} = \begin{bmatrix} 0 \\ -4 \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{bmatrix} 3 \\ 2 \end{bmatrix} + 3\vec{x} = \begin{bmatrix} 0 \\ -4 \end{bmatrix} \Rightarrow 3\vec{x} = \begin{bmatrix} 0 \\ -4 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 3 \\ 2 \end{bmatrix}$ $3\vec{x} = \begin{bmatrix} -3 \\ -6 \end{bmatrix} \Rightarrow \vec{x} = \begin{bmatrix} -1 \\ -2 \end{bmatrix}$ ب) اگر $\vec{a} = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix}$ و $\vec{b} = 2\vec{i} + \vec{j}$ باشد مختصات بردار $\vec{x}$ را پیدا کنید. $\vec{i} + \vec{x} + 2\vec{a} + 2\vec{b} = 0 \Rightarrow \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} + \vec{x} + 2\begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix} + 2\begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix} = 0 \Rightarrow \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} + \vec{x} + \begin{bmatrix} 4 \\ 4 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 4 \\ 2 \end{bmatrix} = 0$ $\begin{bmatrix} 9 \\ 6 \end{bmatrix} + \vec{x} = 0 \Rightarrow \vec{x} = \begin{bmatrix} -9 \\ -6 \end{bmatrix}$ جمع	۱/۵
۱۸	اگر $\vec{a} = 3\vec{i} + 2\vec{j}$ و $\vec{b} = \vec{i} - 2\vec{j}$ باشد مختصات بردار $\vec{x}$ را به دست آورید. $\vec{x} = -3\vec{a} + 4\vec{b} = -3\begin{bmatrix} 3 \\ 2 \end{bmatrix} + 4\begin{bmatrix} 1 \\ -2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -9 \\ -6 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 4 \\ -8 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -5 \\ -14 \end{bmatrix}$ $\vec{b} = \begin{bmatrix} 1 \\ -2 \end{bmatrix}$ $\vec{a} = \begin{bmatrix} 3 \\ 2 \end{bmatrix}$	۱
۱۹	بردار $\vec{a}$ را روی دستگاه مختصات رسم کنید و آن را بر حسب بردارهای واحد $\vec{i}$ و $\vec{j}$ بنویسید. $\vec{a} = \begin{bmatrix} 3 \\ -2 \end{bmatrix} = 3\vec{i} + (-2)\vec{j}$ 	۱
۲۰	الف) اگر $\vec{m} = 5\vec{j}$ باشد مختصات بردار $\vec{m}$ کدام گزینه است؟ $\vec{m} = 5\vec{j} = 5\begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 5 \end{bmatrix}$ $\begin{bmatrix} 5 \\ 0 \end{bmatrix} \text{ (۴) } \quad \begin{bmatrix} 0 \\ 5 \end{bmatrix} \text{ (۳) } \quad \begin{bmatrix} 5 \\ 1 \end{bmatrix} \text{ (۲) } \quad \begin{bmatrix} 1 \\ 5 \end{bmatrix} \text{ (۱) }$ در هر یک از حالت‌های زیر بردار حاصل جمع را رسم کنید. ب) حالتی را رسم کنید که بردار حاصل جمع سه بردار، از هر یک از سه بردار بزرگتر است. ج) حالتی را رسم کنید که بردار حاصل جمع سه بردار از هر یک از سه بردار کوچکتر است. 	۱/۵