










فصل پنجم	پایه هشتم (دوره اول متوسطه)	نمونه سوالات امتحانی درس ریاضی	ردیف
آزمون به همراه پاسخنامه		بردار مختصات	
		جای خالی را با عدد یا واژه مناسب پر کنید.	۱
		الف) اگر مختصات نقطه A به صورت $A = \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}$ باشد، مختصات قرینه A نسبت به محور x ها می شود	
		ب) بردارهایی که هم راستا، هم اندازه و هم جهت باشند هستند.	
		ج) اگر $\overrightarrow{AB} = \begin{bmatrix} -3 \\ 2 \end{bmatrix}$ باشد آنگاه $\overrightarrow{BA} = \begin{bmatrix} \quad \\ \quad \end{bmatrix}$ می باشد.	
		د) اگر $\vec{a} = \begin{bmatrix} -2 \\ 1 \end{bmatrix}$ باشد آنگاه مختصات بردار $\vec{b} = -3\vec{a}$ برابر است با $\begin{bmatrix} \quad \\ \quad \end{bmatrix}$	
		درستی یا نادرستی هر عبارت را مشخص کنید.	۲
		الف) مختصات بردار $\vec{a} = -4\vec{j} - \vec{i}$ برابر است با $\begin{bmatrix} -4 \\ 0 \end{bmatrix}$	
		ب) در شکل مقابل بردار حاصل جمع $\vec{a} + \vec{b}$ ، بردار $\vec{c}$ می باشد.	
		ج) بردار واحد محور عرض ها را با نماد $\vec{j}$ نمایش می دهیم.	
		د) قرینه نقطه $A = \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}$ نسبت به مبدأ مختصات می شود $A' = \begin{bmatrix} -x \\ -y \end{bmatrix}$	
نادرست	درست		
☐	☐		
☐	☐		
☐	☐		
☐	☐		
		گزینه صحیح را انتخاب کنید.	۳
		الف) در کدام گزینه، حاصل جمع دو بردار $\vec{a}$ و $\vec{b}$ بردار $\vec{c}$ نمی باشد؟	
		☐ (۱)  ☐ (۲)  ☐ (۳)  ☐ (۴) 	
		ب) اگر دو بردار $\vec{m}$ و $\vec{n}$ مساوی یکدیگر باشند مقدار $\vec{a}$ و $\vec{b}$ کدام گزینه است؟	
		☐ (۱) $a=0$ و $b=1$ ☐ (۲) $a=4$ و $b=0$ ☐ (۳) $a=4$ و $b=-5$ ☐ (۴) $a=-4$ و $b=-5$	
		ج) در تساوی $\begin{bmatrix} -1 \\ y+1 \end{bmatrix} = -\begin{bmatrix} x+1 \\ 15 \end{bmatrix}$ مقدار $x+y$ کدام گزینه است؟	
		☐ (۱) ۱۶ ☐ (۲) -۱۶ ☐ (۳) ۱۲ ☐ (۴) -۱۲	
		د) اگر $\vec{a} = \begin{bmatrix} 2 \\ -1 \end{bmatrix}$ و $\vec{b} = \begin{bmatrix} -2 \\ 1 \end{bmatrix}$ باشد آنگاه کدام رابطه درست است؟	
		☐ (۱) $\vec{a} = -\vec{b}$ ☐ (۲) $\vec{b} = -\vec{a}$ ☐ (۳) $\vec{a} + \vec{b} = \vec{0}$ ☐ (۴) همه موارد	
		به سوالات زیر پاسخ کامل بدهید.	۴
		اگر دو بردار $\vec{a} = \begin{bmatrix} 3x+1 \\ y \end{bmatrix}$ و $\vec{b} = \begin{bmatrix} -2 \\ 2y+1 \end{bmatrix}$ هم راستا، هم اندازه و هم جهت باشند مقدار x و y را بدست آورید.	
		حاصل عبارتهای زیر را بدست آورید:	۵
		الف) $\frac{1}{5} \begin{bmatrix} -10 \\ 15 \end{bmatrix} + (-\frac{1}{2}) \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \end{bmatrix} =$	
		ب) $-\frac{2}{3} \begin{bmatrix} -9 \\ 12 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} -7 \\ -2 \end{bmatrix} =$	
		ج) $\begin{bmatrix} 2 \\ 3 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} -5 \\ 6 \end{bmatrix} =$	
		د) $-\begin{bmatrix} -3 \\ 2 \end{bmatrix} - 4 \begin{bmatrix} 0 \\ 5 \end{bmatrix} =$	

فصل پنجم	پایه هشتم (دوره اول متوسطه)	نمونه سوالات امتحانی درس ریاضی	
آزمون به همراه پاسخنامه		بردار مختصات	ردیف
$\vec{a} = \begin{bmatrix} 0 \\ -\frac{1}{2} \end{bmatrix}$ $\vec{b} = \begin{bmatrix} -4 \\ 1 \end{bmatrix}$		الف) بردارهای زیر را بر حسب بردارهای واحد مختصات بنویسید. ب) مختصات بردارهای داده شده را بنویسید. $\vec{a} = -\frac{1}{2}\mathbf{i}$ $\vec{b} = \mathbf{j} - 4\mathbf{i}$	۶
$2\vec{x} - \vec{j} = 3\vec{a} + \vec{b}$		الف) اگر $\vec{a} = 3\mathbf{i} - 2\mathbf{j}$ و $\vec{b} = -2\mathbf{i} + \mathbf{j}$ باشد مختصات بردار $\vec{x} = 5\vec{a} + 3\vec{b}$ را بدست آورید. ب) اگر $\vec{a} = 3\mathbf{i} - 2\mathbf{j}$ و $\vec{b} = -2\vec{a}$ باشد مختصات بردار $\vec{b}$ را بدست آورید. ج) اگر $\vec{a} = \begin{bmatrix} 3 \\ -2 \end{bmatrix}$ و $\vec{b} = \frac{1}{2}\vec{a}$ باشد مختصات بردار $\vec{x} = 5\vec{a} + 3\vec{b}$ را بدست آورید. د) اگر $\vec{a} = 3\mathbf{i} - 2\mathbf{j}$ و $\vec{b} = \mathbf{j} - 2\mathbf{i}$ باشد معادله مختصاتی زیر را حل کنید.	۷
الف) $\mathbf{i} - 2\mathbf{j} + \vec{X} = 3\mathbf{i}$ د) $3\vec{X} - 3\vec{j} = 2\mathbf{i} - 3\mathbf{j} + 10\mathbf{i} - 15\mathbf{j}$		معادله‌های مختصاتی زیر را حل کنید. ج) $2\mathbf{i} - \mathbf{j} - 3\vec{X} = \begin{bmatrix} -6 \\ 3 \end{bmatrix}$ ب) $4\vec{X} + \begin{bmatrix} -2 \\ 5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -10 \\ 17 \end{bmatrix}$ و) $\vec{X} = -2\begin{bmatrix} -1 \\ 2 \end{bmatrix} + \frac{1}{2}\begin{bmatrix} 2 \\ -4 \end{bmatrix}$ هـ) $9(-\mathbf{i} + \mathbf{j}) + \frac{1}{2}\vec{X} = \begin{bmatrix} -3 \\ -1 \end{bmatrix}$	۸
الف) دو بردار $\vec{a} = \begin{bmatrix} 5x-3 \\ 4y-3 \end{bmatrix}$ و $\vec{b} = \begin{bmatrix} 2x+6 \\ 9 \end{bmatrix}$ با یکدیگر مساویند مقدار x و y را بدست آورید. ب) دو بردار $\vec{a} = \begin{bmatrix} 5x-3 \\ 4y-3 \end{bmatrix}$ و $\vec{b} = \begin{bmatrix} 2x+6 \\ 9 \end{bmatrix}$ قرینه یکدیگر می‌باشند مقدار x و y را بدست آورید.			۹
الف) 		ب) 	۱۰
بردار $\vec{a}$ را در امتداد نیم خطهای OX و OY تجزیه کنید.			۱۱
		اگر $\vec{b} = -2\mathbf{i}$ و $\vec{c} = 3\vec{a} - 2\vec{b} = \begin{bmatrix} -13 \\ 3 \end{bmatrix}$ باشد مختصات بردار $\vec{a}$ را بدست آورید.	۱۲
برای شکل‌های داده شده یک جمع برداری و یک جمع مختصاتی بنویسید.			۱۳
با توجه به شکل داده شده بردار $\vec{c} = -2\vec{a} + \vec{b}$ را رسم کنید و سپس مختصات $\vec{c}$ را بدست آورید.			۱۴

جای خالی

طول و هم در عرض ضرب می‌شود. $\vec{b} = -3 \begin{bmatrix} -2 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} +6 \\ -3 \end{bmatrix}$ (د) چون اگر عددی در یک بردار ضرب شود هم در

(د) درست

(د) گزینه ۴

$$2y + 1 = 5 \rightarrow 2y = 5 - 1 \rightarrow \frac{2y}{2} = \frac{4}{2} \rightarrow y = 2$$
$$c) -1 \begin{bmatrix} -3 \\ 2 \end{bmatrix} - 4 \begin{bmatrix} 0 \\ 5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} +3 \\ -2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ -20 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 \\ -22 \end{bmatrix}$$



الف) $\vec{d} = \vec{a} + \vec{c}$


$$\begin{bmatrix} +1 \\ +3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -2 \\ +1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} +3 \\ +2 \end{bmatrix}$$

ب) $\vec{a} + \vec{d} + \vec{b} = \vec{c}$


$$\begin{bmatrix} +1 \\ +2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} +3 \\ +1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ -4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} +4 \\ -1 \end{bmatrix}$$

۱۴- می‌توانیم ابتدا هم a را ۲ برابر و هم قرینه می‌کنیم، b را دو برابر و خود c را در نظر بگیریم سپس حاصل جمع را به روش متوالی و با شروع از نقطه A رسم کنیم.


$$\vec{d} = -2\vec{a} + 2\vec{b} + \vec{c} = -2 \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \end{bmatrix} + 2 \begin{bmatrix} 0 \\ -3 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} -1 \\ 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -4 \\ 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ -6 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} -1 \\ 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -5 \\ -3 \end{bmatrix}$$



۱۵- $\vec{c} = -2\vec{a} + \vec{b} = -2 \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} -1 \\ 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -4 \\ 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} -1 \\ 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -5 \\ 2 \end{bmatrix}$



۱۶- $\vec{c} = 2\vec{i} - 2\vec{j} = 2 \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} - 2 \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ -2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ -2 \end{bmatrix}$



هـ) $9(-i + j) + \frac{1}{3}\vec{x} = \begin{bmatrix} -3 \\ -1 \end{bmatrix} \rightarrow -9i + 9j + \frac{1}{3}\vec{x} = -3i - 1j$

$$\frac{1}{3}\vec{x} = -3i - 1j + 9i - 9j = 6i - 10j$$

$$\frac{1}{3}\vec{x} = 6i - 10j \quad \frac{1}{3}\vec{x} \times 3 = \frac{2}{1} = \frac{2}{1}(6i - 10j) \quad \vec{x} = 12i - 20j = \begin{bmatrix} 12 \\ -20 \end{bmatrix}$$

برای حذف ضریب $\frac{1}{3}$ باید دو طرف در معکوس $\frac{3}{1}$ یعنی ۳ ضرب شود.

و) $\vec{x} = -2 \begin{bmatrix} -1 \\ 2 \end{bmatrix} + \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 2 \\ -4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} +2 \\ -4 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 \\ -2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 \\ -6 \end{bmatrix}$

عرض a = عرض b

طول a = طول b

الف) $4y - 3 = 9$

$5x - 3 = 2x + 6$

$4y = 9 + 3$

$5x - 2x = 6 + 3$

$4y = 12$

$3x = 9$

$y = \frac{12}{4} = 3$

$x = \frac{9}{3} = 3$

ب) اگر دو بردار قرینه یکدیگر باشند طولها قرینه هم و عرضها هم قرینه یکدیگر خواهند بود.

قرینه طول b = طول a

قرینه عرض b = عرض a

$5x + 3 = -(2x + 6)$

$4y - 3 = -9$

$5x + 3 = -2x - 6$

$4y = +3 - 9$

$5x + 2x = -3 - 6$

$\frac{4y}{4} = \frac{-6}{4} \rightarrow y = -\frac{6}{4} = -\frac{3}{2}$

$\frac{7x}{7} = \frac{-9}{7} \rightarrow x = -\frac{9}{7}$

الف) $\vec{f} + \vec{g} = \vec{a}$ (روش متوازی الاضلاع)



۱۰-

ب) $\vec{a} + \vec{b} + \vec{c} = \vec{d}$ (روش متوالی)

۱۱-

روش متوازی الاضلاع

روش متوالی



۱۲- به جای c و b مقادیرشان را قرار می‌دهیم و سپس با حل معادله مختصات a را محاسبه می‌کنیم.

$\vec{c} = 3\vec{a} - 2\vec{b} = \begin{bmatrix} -13 \\ 3 \end{bmatrix} \quad \vec{b} = -2\vec{i} = \begin{bmatrix} -2 \\ 0 \end{bmatrix}$

$3\vec{a} - 2 \begin{bmatrix} -2 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -13 \\ 3 \end{bmatrix}$

$3\vec{a} - \begin{bmatrix} -4 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -13 \\ 3 \end{bmatrix}$

$3\vec{a} = \begin{bmatrix} -13 \\ 3 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} -4 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -17 \\ 3 \end{bmatrix} \quad \vec{a} = \begin{bmatrix} -17 \\ 3 \end{bmatrix} \div 3 = \begin{bmatrix} -\frac{17}{3} \\ 1 \end{bmatrix}$